



Вакцина для профилактики гриппа

Ф Л Ю - М

Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная

ФЛЮ-М ФОРМИРУЕТ РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА К АКТУАЛЬНЫМ ШТАММАМ ГРИППА ТИПОВ А И В. ИММУНИТЕТ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 8-12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ И СОХРАНЯЕТСЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ.


Показания к применению:

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6 лет, подростков и взрослых (включая лиц старше 60 лет). Для вакцинации детей от 6 до 18 лет применяется вакцина без консерванта.



Противопоказания:

- Возраст до 6 лет, возраст до 18 лет (при применении вакцины, содержащей консервант).
- Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, на ранее вводимые гриппозные вакцины.
- Сильная реакция (температура выше 40 градусов, отёк и гиперемия в месте введения выше 8 см в диаметре) или осложнение на предыдущее введение препарата.
- Острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.



НА ТЕРРИТОРИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ФЛЮ-М ПОСТУПИЛ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ **ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**



Для вакцинации против гриппа обратитесь в поликлинику по месту прикрепления.

Способ введения:

Вакцина вводится однократно в дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в область дельтовидной мышцы).



Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом (фельдшером) с проведением термометрии.